

Дезинфекция	Концентрация	Экспозиция	Норма расхода рабочего раствора	Метод дезинфекции
Животноводческие помещения и оборудование	1-1,5%	1 час	0,3 л/м ²	Орошение
Ниппельное поение и трубопровод (в т.ч. СІР)	0,5%	45-90 минут	Заполнение системы поения	
Инкубационные и выводные шкафы, яйцесклады, молочные блоки, яичная тара	1%	2 часа	0,25-0,3 л/м ²	Орошение
Туберкулез, в т.ч. на мясоперерабатывающих предприятиях, сан.бойнях	1-2%	2 часа	0,3 л/м ²	Протирание ветошью или орошение
Птичий грипп	1-1,5%	2 часа	0,25-0,3 л/м ²	Орошение
	1%	8 часов	50 мл/м ³	Термомеханические аэрозоли
АЧС	1% (3%)	3 часа (1 час)	0,3 л/м ²	Орошение
Мясная промышленность (профилактика)	0,5%	30 минут	0,25 л/м ²	орошение
При вирусных заболеваниях	0,5 % (1%)	1 час (30 мин)	0,25 л/м ²	Орошение
Трудно обеззараживаемые поверхности – 2-кратно с интервалом 15-20 минут		2 часа		
Вет.инструмент, кормоцеха, кормокухни	0,5%	1 час	0,25 л/м ²	Погружение, протирание или орошение
Термомеханические аэрозоли	5-10%	От 6 часов	20-30 мл/м ³	АИСТ и тд
Санация воздуха	0,1-0,3%	Профилактика 1 р в 7 дней В угрожаемых зонах: 8-10 обработок с интервалом 2-3 дня При появлении признаков заболевания: 1 раз 5-6 дней		САГ, Циклон, АГП
Дезинфекция транспорта (профилактическая/ Вынужденная)	1%/2%	0,5-1 час	0,25-0,3 л/м ²	Протирание или орошение
Дез.барьеры с опилками и дезковрики	1%	Поддержание влажной поверхности		
Дез.барьеры (ямы)	0,1%	Обновление 1р в 14 дней		